


東大西洋・地中海 East Atlantic & Mediterranean Sea

FAO名(英): African squid


ML ♂19cm, ♀9cm. 細身のヤリイカ型で、外套膜は後方著しく伸び、特に雄では顕著な尾部になっている。鰭は丸味のあるハート型。腕の大吸盤の角質環の先端縁には板状の四角い歯が6~10枚並び、触腕大吸盤角質環は同大の鈍歯が20~30個ある。前種ホントトガリイカと極めて良く似ているが、分布は重り合わない。

Male with very prolonged tail. Fins heart-shaped. Arm sucker rings with 6-10 square teeth on distal margin. Club sucker rings with 20-30 blunt teeth of equal size. Allopatric with *A. subulata*.

[A. 背面(♂140mm) : B. 腹面(♂195mm) : C. 腹面(♀86mm)]



A: 遠洋水産研究所(アンゴラ), B, C: Adam (1952)




FAO名(英): Crowned firefly squid

ML 18cm. 腕吸盤は2列。雄のII腕は著しく延長し触腕より長い。触腕基部には吸盤4個と肉瘤2個がある。掌部から先端までは吸盤は4列。発光器は触腕柄に5個埋入、眼球腹面に5個(中央のものは紫青色、他の4個は赤色)、外套腔の肛門両脇に赤色発光器が1個ずつ、鰓基部付近に1個ずつ、その間に大1個小2個が横に並び、内臓囊後方に3個ある。軟甲翼部の後方にくびれがあり、終端は浅い匙状。南半球温帯域。*Thaumatomolampas diadema* Chun, 1900は異名。

Arm suckers biserial. Arm II in male longer than tentacle. Carpus with four suckers and two pads. Manus and dactylus suckers in four rows. Five photophores embedded in tentacle stalk, five on ventral periphery of eyeball (central one purplish blue, and other four red), red one on both sides of anus, one each at gill base, one large and two small across mid-body, and three on posterior visceral mass. Vane of gladius with weak constriction at posterior portion with shallow spoon-like end. Temperate zone in the Southern Hemisphere. *Thaumatomolampas diadema* Chun, 1900 is a synonym.

[A. 背面(♂) : B. 腹面(♀65mm)]



A: Dunning & Lu (Hollis) (1998), B: Voss (1962)

