

ホッカイテカギイカ


Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818) / テカギイカ科 Gonatidae

FAO名(英): Boreoatlantic gonate squid


ML 30 cm. 外形はスルメイカ型であるが、外套膜は細く、皮膚は柔らかい。鰭は両端丸味のある菱形。本科の腕吸盤列は全て4列。I~III腕は基部の方は内側2列が鉤列で縁側2列が吸盤であるが、第IV腕は4列とも吸盤。触腕は長く、掌部は広くなっていて中央に特別大きい鉤が1個とそれに続いて3小鉤と1吸盤がある。寒帯~亜寒帯北大西洋。水深500mくらいまで。

Body slender with rather soft integument. Arm sucker rows of this family all quadriserial. Arms I-III with mesial two rows of hooks and marginal two rows of suckers, while Arm IV with only suckers in four rows. Tentacular manus with huge hook followed proximally by three small hooks and one small sucker. Arctic and Subarctic North Atlantic. Subsurface to 500 m depth.

[A. 背面; B. 腹面 (♀129mm); C. 触腕]



A: 藤倉克則 (グリーンランド), B, C: Kristensen (1981)



オーロラテカギイカ


Gonatus steenstrupi Kristensen, 1981 / テカギイカ科 Gonatidae

FAO名(英): Atlantic gonate squid

ML 15 cm. 外套膜は細い円錐型で厚い。後端は尾状に終る。鰭は菱形。IV腕は吸盤4列であるがI~III腕には吸盤2縁側と内側に鉤2列並ぶ。触腕は掌部が大きく、吸盤は偏るが、中央に大きい鉤が1個あり、それに続いて先端方に1中鉤、基方に向けてだんだん小さくなる4~5鉤がある。亜寒帯北大西洋。水深1,000mくらいまで。

Mantle slenderly conical, thick, ending in tail with conus of gladius. Fins sagittate. Arms I-III with marginal sucker rows and mesial two rows of hooks except for Arm IV which has quadriserial suckers. Tentacular club with large central hook with single medium hook distally and 4-5 hooks progressively diminishing in size proximally. Subarctic North Atlantic. Probably down to 1,000 m depth.

[A. 背面 (♂94mm); B. 腹面 (♀129mm); C. 触腕]



A: 藤倉克則 (グリーンランド), B, C: Kristensen (1981)

