



A : 窪寺恒己 (三陸沖). B, C : Young (1972)

ML 19 cm. 全身紫褐色。外套膜は円筒形。鰭の両端はやや丸みがあり、外套膜後端の比較的長い尾部に対応して後方に伸びる。腕は太く、第IV腕を除いて吸盤の縁列と内側の2鈎列からなる。触腕は太く吸盤が偏って生じた掌部中央に極めて大きい1鈎があり、その前方に1中鈎がある。基部寄りには微小2吸盤があつてさらに2~4個の小鈎が1列に並んでいる。先端吸盤は規則的な4列。触腕柄部には左右に分かれた基部吸盤列の間には全く吸盤を欠く。三陸沖から亜寒帯北太平洋、ベーリング海。

Mantle cylindrical. Body dark purplish in color. Fins with rounded lateral lobes and drawn into rather elongated tail posteriorly. Arms robust, with two marginal sucker rows and two mesial hook rows. Tentacle strong. Manus with one enormous hook, and distal medium-sized hook, proximal two minute suckers, and 3-4 small hooks in single row. Tentacle stalk totally naked between ventral and dorsal carpal sucker rows. Dactylus suckers in four regular rows. Off Sanriku Coast to the Subarctic Pacific, and the Bering Sea.

[A. 背面 ; B. 腹面 (119mm) ; C. 触腕]



A, B : Jefferts (1985)

ML 46mm の若い個体しか知られてないので、外套膜は幅広く、長さの30~43%。鰭は楕円型で長さは外套長の39%、幅は80%。腕の吸盤は4列で、中央2列の吸盤はI~III腕の先端部とIV腕を除いて鈎に変形している。触腕掌中央部に大鈎が1個あり、その先に中鈎1個、手前には3~4個の小鈎がある。先端部吸盤は7~8列であるが先にいくと5~6列になる。基部吸盤は小さく柄部に向かって背列に最低63個、腹列に最低74個。それらの間に最低70個の微小吸盤が散在する。オレゴン州沖。

Only young specimens, with maximal ML 46 mm, have been known. Mantle wide, width 30-43% of ML. Fins elliptical, FL 39%, FW 80% of ML, respectively. Arm suckers in four rows, suckers of mesial two rows transformed into hooks except in Arm IV and tips of Arms I-III. Tentacular club with large central hook, one medium hook distal to it, and 3-4 proximal small hooks. Dactylus suckers 7-8 rows, becoming 5-6 rows towards distal end. Carpal suckers minute, at least 63 in dorsal row, 74 in ventral row, and at least 70 dispersed suckers between them. Off Oregon.

[A. 腹面 (46mm) ; B. 触腕]

