




A, B : Young et al. (2006)

ML 100 mm. 全身紫褐色。鰭は丸みがあって大きい。頭部は小さく、眼も小さく眼瞼は小孔状。腕には反口側泳膜を欠くが保護膜は厚いが低い。腕吸盤は3~6の不規則列。触腕は太く多数の肉嘴が基部から2列走り、掌部に向かって側方に別れる。また触腕柄の側縁に沿って基部から走る濃色の隆起が走る。触腕には微小な吸盤が多数ある。墨汁嚢も発光器も無い。中央~東北大西洋、水深約2700 m 付近の中層。

Body uniformly purple brownish in color. Fins large, oval. Head small. Eyes small with hole-like eyelid. Arms lack aboral keel, but with thick and low protective membrane. Arm suckers in irregular 3-6 rows. Tentacle thick, with numerous fleshy papillae in two rows running from base, diverging to lateral side distally. Pigmented ridge also running along lateral margins of tentacular stalk. Tentacle suckers minute, numerous, irregularly arranged. No ink sac nor light organ present. Central to eastern North Atlantic, mid-water around 2700 m depth.

[A. 背面 (102 mm) ; B. 右側面 (58 mm)]



A-C : Young et al. (2007)

ML 25 mm. 外套膜はやや短く、鰭は丸い。眼の開口は小さい。外套膜と頭部は頸部では癒着する。腕は太短かくほぼ等長で反口側の泳膜は無く保護膜も低く、口側は濃紫褐色。腕吸盤は不規則な3列で、角質環は無歯。触腕は第III腕の倍くらい太い。触腕柄の反口側の2/3~3/4に亘って深い溝が走るほか長さの25~35%が紫褐色に染まる。触腕吸盤は微小、多数、配列は不規則。基部・掌部・先端部に分化してないが、反口側から側部にかけて柔らかいクッションのような皺がある。墨汁嚢を欠き、発光器も無い。南大西洋の水深1750~2000 m。

Mantle rather short, fused with head at nuchal part. Fins circular. Eye orifice small. Arms short, subequal in length, stained in dark purple on oral side, without aboral keel, with low protective membrane. Sucker ring not toothed. Tentacle twice thicker than Arm III. Tentacle stem with deep groove, 2/3 to 3/4 in length, and stained purplish brown, 25-35% in length. Tentacle suckers minute, innumerable, irregularly arranged. No differentiation into carpus, manus and dactylus. Soft cushion-like folds present from aboral to lateral side. No ink sac nor light organ present. South Atlantic, mid-water between 1750 and 2000 m depth.

[A. 背面 (♀25 mm) ; B. 腹面 ; C. 触腕基部]

