


アメリカ大陸 Americas

ML 20 mm. 概形はチチュウカイヒカリダンゴイカに酷似しているが、雄の III 腕の内列に通常吸盤の 5 倍くらいの拡大吸盤が 3 個ある (チチュウカイヒカリダンゴイカでは、通常吸盤の約 9 倍の巨大吸盤が 2 個) が、外列の 1.5 倍くらいの拡大吸盤と交互に並ぶ、南西大西洋 (ブラジル沖)、中層。

General appearance so close to *H. dispar*. But, three enlarged suckers, as large as five times larger than normal suckers, present on inner row of male Arm III (in *H. dispar* two enlarged suckers, nine times larger than normal suckers, present on male Arm III) alternating with 1.5 times larger suckers on outer row. Southwest Atlantic Ocean (off Brasil), Midwaters.

[A. 背面 (♂16 mm) : B. 同腹面 : C. 口側面 (♂13 mm)]

A-C : Rotermund & Guerrero-Kommritz (2010)



アメリカ大陸 Americas

ML 32mm. 外套膜はドーム状で、柔軟。チョコレート色。外套膜前葉は三角形に突出。鰭は耳型で大きく基底長は外套長の 70% 近くになり、前葉は外套縁を超える。眼は大きい。腕吸盤は 2 列、III 腕はやや長い。触腕掌部は拡がらず、長く、微小吸盤が密生する。デビス海からニューイングランドにかけてのやや深海にすむ。

Bobtail squid with rather flabby mantle. ML 32 mm. Chocolate brown in color. Anterior lobe of dorsal mantle triangurllaly protruded. Fins very large with basal length attaining some 70% of ML, and anterior lobe exceeding mantle margin. Eye enormous. Arm suckers biserial. Arm III rather long. Tentacular club not expanded but long, with heavily crowded minute suckers. In deep sea mainly from the Davis Straits down to New England.

[A. 背面]

A : 藤倉克則 (グリーンランド)

