


ピックフォードイカ *Pickfordiateuthis pulchella* Voss, 1953 / ヤリイカ科 Lolinidae

アメリカ大陸 Americas


ML 22 mm. 外套膜は円筒形で後端は丸く、鰭はダンゴイカ類のように耳状。腕の吸盤は2列。雄左I腕は交接腕化していて、先端方は吸盤が1列になっていて、外側に肉厚の半月形隆起がある。触腕吸盤は2列であるが、先端方半分は4列。軟甲の翼部は後半2/3に広がり、スプーン型。フロリダキーからカリブ海、ブラジルのアマモ帶。

Small squid living in sea-grass bed. Mantle cylindrical with blunt end. Fins round and separated like sepiolids. Arms with biserial suckers. Male left Arm I hectocotylized: Suckers in distal portion become single row with lunate pad-like crest. Tentacular suckers in two rows in manus, but become four rows in dactylus. Gladius vane extended two-thirds of length, broad with spoon-like appearance. Florida Key to the Caribbean Sea and Brazil. In sea-grass bed.

[A. 背面 (♀21.8 mm) : B. 軟甲 : C. 触腕]



A-C : Brakonicki (1996)




メキシコマメイカ^(*) *Pickfordiateuthis vossi* Brakoniecki, 1996 / ヤリイカ科 Lolinidae

アメリカ大陸 Americas

ML 13 mm (♂) ~ 15 mm (♀). 前種に似て鰭は丸く後位。触腕の掌部は広がらず、吸盤の分化は不明瞭。基部3吸盤は1列であるが、それ以降先端までは2列で恰も普通腕の様である。軟甲翼部の幅は狭い。同属のピックフォードイカやベイヤーイカは何れもアメリカ東岸産であるが本種はメキシコ太平洋岸(カルフィルニア半島沿岸)である。ホンジュラス~ガイアナにかけて未記載の1種 (*Pickfordiateuthis* sp. Brakoniecki, 1996) が知られる。

Similar to preceding species with terminal round fins. Tentacle club not expanded like normal arms. Three carpal suckers in single row, then biserial to distal tip. Gladius vane narrow. The other congeneric species, *P. pulchella* and *P. bayeri* are both from Atlantic coast of North America, but this species occurs on the coast of Baja California, Mexico. Another undescribed species is known from Honduras to Guyana.

[A. 背面 (♀13.2 mm) : B. 軟甲 (♀17.2 mm) : C. 触腕]



A-C : Brakonicki (1996)

