


ナンキョクテカギイカ

Gonatus antarcticus Lonnberg, 1898 / テカギイカ科 Gonatidae




A : 窪寺恒己 (南大洋), B, C : Kubodera & Okutani (1986)

ML 35 cm. 外套膜は円筒形で細い。鰭は細長い鎌型で、後方は軟甲の終円錐の尾で終り、後縁は大きく凹む。腕は短かためIV腕を除き、吸盤4列中、内側の2列は鈎になる。触腕は本属の他種同様掌部吸盤は偏り、中央に大きい鈎が1個あり、基方に向って小さくなる3~4の小鈎と、先端寄りに大鈎の1/3ぐらいの鈎1個がある。南大洋。


Mantle very slender, conical, ending in an attenuated tail solidified by gladius cone. Fins elongate sagittate with remarkably concave posterior margin. Arms relatively short with four rows of suckers, of which mesial two rows transformed into hooks except in Arm IV. Manus of tentacle with deviated suckers like in other congeneric members, with one large central hook, one medium hook distally and 3~4 very small hooks proximally. Southern Ocean.

[A. 背面 : B. 腹面 (230 mm) : C. 触腕]



テカギイカ

Gonatus onyx Young, 1972 / テカギイカ科 Gonatidae



A : (駿河湾), B, C : Young (1972)

ML 18 cm. 外套膜は長円錐形。鰭は両端やや丸みがある。体色は暗紫褐色。眼は大きい。腕はIV腕を除いて吸盤の縁列と内側の2鈎列からなる。触腕には小吸盤のほか大型の鈎が1個あり、まれにその先端寄りに小鈎が1個あるのみである。亜寒帯北太平洋。駿河湾・カリフォルニア半島。

Mantle elongate conical. Fins with rounded lateral ends. Body color dark. Eyes globose. Arm with two rows of marginal suckers and two mesial rows of hooks except in Arm IV. Tentacle with single enormous central hook besides small suckers, occasionally accompanied by small hook distally. Subarctic North Pacific, down south to Suruga Bay, Japan and to Baja California.

[A. 背面 (σ 55 mm) : B. 腹面 (69 mm) : C. 触腕]

