



A, B : Young (1972)

ML 11cm. 外套膜は細い円錐型で後方は尾状。鰭は菱形。腕はIV腕を除いて2列の外縁に並ぶ吸盤列と内側に2列の鉤がある。触腕は中庸。掌部中央に1大鉤があり、基部寄りには3~5の小鉤、さらに1~2個の小吸盤があり、先端寄りには1中鉤をもつ。先端小吸盤は初め7~8個の不規則列であるが、最後には規則的な4列になる。触腕柄には口側に小吸盤が不規則に散在する。ブリティッシュコロンビア~カリフォルニア半島。

Mantle elongate conical, ending in short tail. Fins sagittate. Arms with two marginal sucker rows and two mesial hook rows except in Arm IV. Tentacle moderate, with one large hook on manus, followed by 3-5 small hooks, 1-2 small suckers proximally, and one medium-sized hook distally. Dactylus suckers in 7-8 irregular rows, but eventually become four regular rows. Oral surface of tentacle stalk with many small suckers. British Columbia, southward to Baja California.

[A. 腹面 (112mm) ; B. 触腕]



A : 窪寺恒己 (三陸沖). B, C : Young (1972)

ML 16cm. 外套膜は細長い円錐型で、鰭は丸味がある。眼は大きく、腹側に発光組織と見られる卵円形のパッチがある。腕は比較的短い。触腕の掌部には大きい鉤があり、その基部寄りには4小鉤、先端寄りには1中鉤がある。亜寒帯北太平洋、三陸沖~カリフォルニア。

Mantle elongate cylindrical. Fins transversely oval. Eyes large with probably photogenic oval patch on ventral periphery. Arms rather short. Tentacle manus with large central hook, four small proximal hooks, and single medium hook distally. Subarctic Pacific, off Sanriku coast to California.

[A. 腹面 ; B. 同 (39mm) ; C. 触腕]

